In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful















Anatomie
2 EMD


Périnée :

Def : c'est l'ensemble des parties molles et aponévroses qui ferme en bas l'excavation pelvienne,
qui laisse passer : – l'urètre et le rectum de l'Homme ♂
– l'urètre, le vagin et le rectum de la femme ♀
il a pour support un cadre ostéo-fibreux de forme losangique avec 2 triangles :
→ un Δ anter urogénital
→ un ▽ poster anal



Position génicologique :





Anatomie
2EMD

Constitution du périnée

le périnée est constitué par :

1. Les muscles organisés en 3 plans

- plans profond du périnée où / diaphragme pelvien
- plans moyen du périnée
- plans superficiel du périnée

2. les aponévroses :

- aponévrose pelvienne ⇓ tapisse les paroi du pelvis (il a dit)
- aponévrose périnéale moyenne avec 2 feuillets
  - profond
  - superficiel.
- aponévrose périnéale superficielle

I. les Muscles


A. Muscles du plans profond

⇓

2 musles

- Le releveur (élévateur) de l'anus avec 2 portions (s'étend de l'avant ver l'arrière)
  - portion élévatrice ⇓ (ouvre le rectum)
  - portion sphinterienne ⇓ (ferme le rectum.)
- Le muscle ischio-coccygien

position génicologique
vue endo-pelvienne
pland profond du périnée


Anatomie
2 EMD
position génicologique
vue exo-pelvienne
partie élévatrice
partie sphinctérienne
le releveur de l'anus
muscle ischio-coccygien
B. Muscles du plans Moyen :
3 muscles
le sphincter externe strié de l'anus
muscle transverse profond du périnée
le sphincter strié de l'urètre
position génicologique
chez ♀
chez ♂
veine dorsal du Clitoris
sphincter de l'urètre
lig sous pubien
lig transverse du pubis
muscle transverse du périnée
sphincter externe de l'anus
Raphée ano-coccygien
presque lig
sphincter de l'urètre.
plus grand
Le noyau fibreux central du périnée
ou
Le centre fibreux du périnée.
(entre le vagin et le rectum)
(très important)
noyau fibreux central du périnée
(aucune importance fonctionelle)
03

Anatomie
2EMD

C. Muscles du plans superficiel du périnée

⇓

3/4 muscles

chez ♀ uniquement

- Le m transverse superficiel
- Le muscle ischio-caverneux
- Le muscle bulbo-spongieux
- Le muscle constricteur de la vulve (important)

la région postérieure du corps spongieux
⇓
bulbe


remarques :
- ♀ : le corps caverneux se fixe sur les branche ischio-pubiennes
  ♂ : la verge s'attache par ces racines au niveau des branche ischio-pubiennes
- les muscle ischio-caverneux et bulbo-spongieux
  ↳ ♀ : responsable à la contraction lors l'act sexuelle ou le coït
  ↳ ♂ : enveloppent les organes érectiles (érection lors de la coït)


pendant l'accouchement


04



II. Les Aponévroses :








Remarques:

× La périnée proprement dit se fragilise pendant l'accouchement.

+ Pénis captivus : cas pathologique rare
  ↳ couple qui ne se sépare pas après un coït

+ Prolapsus → relâchement du périnée
  ↳ les organes de l'abdomen sortent

× glandes de Bartholin ⇒ lubrification du vagin au cours d'une relation



fin :P